

## **Médico alerta para excessos cometidos em nome da vaidade - 10/12/2003**

Conteúdo: Muitas mulheres têm recorrido às novas técnicas de preenchimento labial, em meio à onda de admiração pelas musas dos lábios sensuais. Está aumentando visivelmente, entretanto, o número de mulheres que mais parecem ter sido picadas por uma abelha nos lábios. Ao invés de lábios carnudos, a boca dá a impressão de estar inchada, causando desconforto e constrangimento.

O cirurgião plástico Marcos Grillo, de Curitiba, alerta para a importância de o procedimento ser realizado por um cirurgião plástico ou por um dermatologista experiente: "Somente um profissional especializado saberá dosar a aplicação, de modo a obter um resultado harmônico. Além disso, se mal aplicada, a substância poderá provocar infecção ou ainda o aparecimento de cistos - que deverão ser drenados por um cirurgião".

Segundo Grillo, "é sempre mais indicado pecar pela falta do que pelo excesso, nesses casos. Para não haver deformidades no preenchimento, a substância - de preferência o ácido hialurônico - deve ser injetada em pouca quantidade na primeira sessão. Somente depois de um mês é que se avalia a necessidade ou não de uma nova aplicação".

Outras substâncias utilizadas são o metilacrilato e o artecol. "Todos esses produtos são compostos por um gel viscoso que, uma vez inserido sob a pele, permanece no local por um longo período, geralmente entre um e dois anos", explica o cirurgião. "São aplicações que variam entre R\$ 600 e R\$ 1.500, dependendo da quantidade utilizada. O custo aparentemente elevado do procedimento deve-se ao fato de os produtos serem importados e, portanto, cotados em dólar."

Mulheres que pretendem passar por uma lipoaspiração e gostariam de ter os lábios engrossados, podem aproveitar a gordura retirada para utilizar nos próprios lábios. "Durante a lipoaspiração abdominal, podemos usar a gordura retirada para preencher os lábios. Nesse caso, os riscos de rejeição são praticamente nulos. A aplicação é feita com anestesia local nas pacientes mais sensíveis ou com anestesia tópica, à base de creme anestésico", afirma Grillo.